

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

# BRONTAL<sup>®</sup>

JARABE INFANTIL



Lea cuidadosamente este folleto antes  
de la administración de este medicamento.  
Contiene información importante acerca de su tratamiento.  
Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,  
pregunte a su médico o farmacéutico.  
Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Venta bajo receta médica en Establecimientos Tipo A.

## Composición y Presentación

### Composición:

Cada 100 mL de jarabe contiene:

Bromhexina Clorhidrato	0,0200g
Clofedanol Clorhidrato	0,1400g

**Excipientes:** sacarina sódica 0,03 g, acesulfamo de potasio 0,05 g, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, benzoato de sodio, esencia de damasco, colorante FD&C amarillo N° 5, sorbitol 70%, agua purificada.

### Presentación:

Envase de venta: Frasco 100 mL.

**Clasificación:** Antitusígeno, expectorante.

### 1.-¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de la tos seca o productiva. Procesos inflamatorios del árbol respiratorio, laringitis, traqueitis, neumonitis, tos tabáquica, bronquitis espasmódica, bronquioectasias.

### 2.-Administración:

Vía oral.

**Este medicamento debe ser usado sólo por indicación médica.**

### Rango y frecuencia:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- 4 meses -1 año:** 5 mL 3 veces al día.
- 1 año - 3 años:** 7,5 mL 3 veces al día.
- 3 año - 6 años:** 10 mL 3 veces al día.
- 6 año - 12 años:** Hasta 20 mL 3 veces al día.

### 3.-Precauciones

**Mayores de 60 años:** Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos.

**Manejo de vehículos:** Puede provocar somnolencia en algunos pacientes aun que en menor grado que la codeína. Asegúrese de los efectos que este medicamento ejerce sobre Ud. antes de manejar vehículo o maquinaria peligrosa.

**Embarazo:** Se debe administrar con cierta precaución a mujeres embarazadas, aunque no se ha reportado ningún peligro aparente en esta asociación.

**Niños:** No administrar a niños menores de 4 meses de edad.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a Bromhexinao Clofedanol.  
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**5.-Interacciones**

**Medicamentos:**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Depresores del sistema nervioso central, asociado con tranquilizantes, se puede producir una somnolencia muy acentuada, asociado con el alcohol se han descrito síntomas de excitabilidad, pero que desaparecen rápidamente.

**Enfermedades:**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica o severa. Especialmente en los casos de antecedentes convulsivos y úlceras gástricas.

**6.- Efectos Adversos**

**Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:** Puede producir somnolencia. Se ha observado la aparición de alucinaciones y síncope con las dosis recomendadas. Se han descrito también síntomas de hiperexcitabilidad o embotamiento del sistema nervioso central y, con frecuencia algo mayor, trastornos gastrointestinales diversos. Excitación, irritabilidad, insomnio, mareos, vómitos, sequedad en la boca.

**7.-Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.- Condiciones de Almacenamiento**

- Mantener lejos del alcance de los niños.  
- Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a la temperatura señalada en el envase.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes al médico.  
No recomiende este medicamento a otra persona.**

Elaborado y distribuido en Chile por  
**INSTITUTO SANITAS S.A.**  
Avda. Américo Vespucio 01260  
Quilicura, Santiago  
www.sanitas.cl  
Mayor información en: www.ispch.cl

**Sanitas**<sup>®</sup>