

CARVEDILOL

COMPRIMIDOS 25 mg.



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda, consulte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su Médico.

NO FRACCIONAR EL COMPRIMIDO

Venta bajo receta médica en Establecimientos tipo A.

COMPOSICIÓN:

CARVEDILOL 25 mg

Cada comprimido contiene:

Carvedilol 25 mg

Excipientes: lactosa monohidrato, almidón de maíz pregelatinizado, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, talco.

CLASIFICACIÓN:

Antihipertensivo.

Agente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.

1.- INDICACIONES:

CARVEDILOL se usa para reducir la presión arterial elevada (hipertensión) y para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva sintomática.

2.- MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Siga exactamente las instrucciones de uso.

No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que lo indicado por el Médico. Tome el medicamento por vía oral, con un vaso lleno de agua, de preferencia junto con los alimentos. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si ya casi es tiempo de la siguiente dosis, no la tome y continúe con su horario habitual.

3.- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los siguientes aspectos:

a) Alergias: usted debe comunicar a su Médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

b) Embarazo: Este producto no debe ser usado durante el embarazo.

c) Lactancia: la lactancia está desaconsejada durante la duración del tratamiento.

d) Niños: No existe información específica con el uso de carvedilol en niños.

e) Ancianos: los ancianos no han mostrado ser más sensibles que los adultos y jóvenes a los efectos de carvedilol. Sin embargo, ellos podrían experimentar vértigo con mayor frecuencia.

f) Efectos sobre la capacidad de conducir y manejar maquinaria: se debe prevenir a los pacientes de no conducir vehículos o utilizar máquinas si se presenta aturdimiento o síntomas similares bajo tratamiento. Esta precaución se debe ejercer sobretodo al inicio del tratamiento o cuando el tratamiento se modifica.

g) Otros: los pacientes que toman este medicamento deberán ser advertidos de lo siguiente: No deberán interrumpir o discontinuar el tratamiento sin consultar antes al Médico.

- Los pacientes con falla cardíaca congestiva deberían consultar a su Médico si ellos experimentan signos o síntomas de empeoramiento de falla cardíaca, tales como aumento de peso o respiración más larga o mas corta.

- Los pacientes pueden experimentar una baja de la presión sanguínea cuando están de pie, produciendo vértigo y raramente desmayo, el paciente deberá sentarse o acostarse cuando estos síntomas de presión baja ocurren.
- Los pacientes diabéticos deberán informar a su Médico cualquier cambio en los niveles de azúcar.
- En caso de usar lentes de contacto puede experimentar disminución de las lágrimas.
- Informe a su dentista que está tomando carvedilol antes de someterse a una cirugía o extracción dental.
- Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

4.- CONTRAINDICACIONES:

No usar en:

Asma bronquial, Shock cardiogénico, Hipotensión severa, Bradicardia severa, Insuficiencia hepática severa, Insuficiencia cardíaca descompensada, Bloqueo aurículo ventricular en segundo y tercer grado, Síndrome sinusal, acidosis metabólica, fenómenos de Raynaud y problemas circulatorios periféricos. Pacientes alérgicos a Carvedilol.

5.- PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

Los efectos de un medicamento pueden verse alterados por la presencia de otra enfermedad. Informe al Médico si usted padece alguna enfermedad, especialmente en los siguientes casos:

Trastornos de la función renal o hepática, angina variante Prinzmetal, feocromocitoma, hipertiroidismo, enfermedades bronquiales, diabetes.

6.- INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Informe al Médico todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Pueden presentarse interacciones con los siguientes medicamentos:

Quinidina, fluoxetina, paroxetina, propafenona, reserpina, clonidina, digoxina, diltiazem, verapamilo, medicamentos para el tratamiento de la diabetes tales como clorpropamida, glicazide, glipizide, tolbutamida u otros: insulinas; otros medicamentos para el tratamiento de la hipertensión o angina.

7.- EFECTOS ADVERSOS (no deseados):

Todo medicamento puede producir algún efecto no deseado además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica .

Consulte inmediatamente al Médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: Reacciones alérgicas (enrojecimiento de la piel, picazón), dificultad para respirar, dolor de pecho, sensación de hormigueo en las extremidades, ganancia de peso.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica como: dolor de cabeza. Al incorporarse rápidamente vértigos, cansancio, fatiga (sentarse o tenderse puede ayudarlo a aliviar estos efectos). No obstante si continúan o se intensifican, consulte al Médico.

8.- SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al Médico o recurra a un centro asistencial.

9.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en su envase original, protegido de la luz y la humedad, a no más de 25° C.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA

S-ME5262 / V2 / 072019

Elaborado y Distribuido en Chile por

INSTITUTO SANITAS S.A.

Av. A. Vespuccio 01260, Quilicura - Santiago

www.sanitas.cl

Mayor información en www.ispch.cl

Sanitas®